

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

ANNÉE 1962

THÈSE

N°

1281

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE

(DIPLOME D'ÉTAT)

PAR

Jean, Georges, Julien DECHERF

Ancien Externe des Hôpitaux de Paris

Né le 22 mars 1933, à Béthune (Pas-de-Calais)

Présentée et soutenue publiquement le

1962

**Manifestations oto-rhino-laryngologiques
de la dermatite bulleuse muco-synéchiante**

Président : M. AUBRY, Professeur

IMPRIMERIE
R. FOULON & C^{ie}
29, RUE DEPARCIEUX, 29
PARIS — 1962

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

ANNEE 1962

THÈSE

N°

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE

(DIPLOME D'ÉTAT)

PAR

Jean, Georges, Julien DECHERF

Ancien Externe des Hôpitaux de Paris

Né le 22 mars 1933, à Béthune (Pas-de-Calais)

Présentée et soutenue publiquement le

196

**Manifestations oto-rhino-laryngologiques
de la dermatite bulleuse muco-synéchiante**

Président : M. AUBRY, Professeur



IMPRIMERIE
R. FOULON & C^{ie}
29, RUE DEPARCIEUX, 29
PARIS — 1962

PROFESSEURS HONORAIRES :

MM. Alajouanine (T.), Aubin (A.), Bénard (H.), Bulliard (H.), Cadenat (F.), Chabrol (E.), Champy (C.), Debré (R.), Fey (B.), Gastinel (P.), Halphen (E.), Hazard (R.), Heuyer (G.), Lantuejoul (P.), Laroche (G.), Lévy-Solal (E.), Lian (C.), Mathieu (P.), Mocquot (P.), Mondor (H.), Monod (R.), Moreau (R.), Moulonguet (P.), Olivier (E.), Pasteur Valléry-Radot, Petit-Dutaillis (D.), Quénu (J.), Richet (C.), Senèque (J.), Strohl (A.), Tanon (L.).

DOYEN : Léon BINET, *Membre de l'Institut*

1^{er} ASSESSEUR : Jean VERNE — 2^e ASSESSEUR : Gaston CORDIER

I. — PROFESSEURS

1° CHAIRES DE SCIENCES FONDAMENTALES

a) PROFESSEURS TITULAIRES :

MM.

Anatomie	DELMAS (A.)
Anatomie pathologique	DELARUE (J.)
Anesthésiologie	BAUMANN (J.)
Biochimie médicale	JAYLE (M.-F.), SCHAPIRA (G.)
Biologie appliquée à l'Educat. phys. et aux Sports	CHAILLEY-BERT (P.)
Biologie médicale	FAUVERT (R.)
Cancérologie médicale et sociale	BERNARD (J.)
Embryologie	GIROUD (A.)
Histoire de la médecine et de la chirurgie (Lariboisière)	N...
Histologie	VERNE (J.)
Hygiène et médecine préventive	JOANNON (P.)
Médecine du Travail	DESOILLE (H.)
Médecine légale	PIEDELIEVRE (R.)
Microbiologie (Bactériologie et virologie)	FASQUELLE (R.)
Parasitologie	GALLIARD (H.)
Pathologie chirurgicale	HUGUIER (J.)
Pathologie exotique	LAVIER (G.)
Pathologie expérimentale et comparée	MERKLEN (F.-P.)
Pathologie médicale	MILLIEZ (P.)
Pathologie respiratoire	TURIAF (J.)
Pathologie et thérapeutique générales	BOUDIN (G.)
Pharmacologie	CHEYMOL (J.)
Physiologie	BINET (L.), BARGETON (D.)
Physiologie et pathologie obstétricale	LEPAGE (F.)
Physique médicale	DOGNON (A.), DJOURNO (A.)
Radiologie médicale	DESGREZ (H.)
Technique chirurgicale et Chirurgie expérimentale . .	N...
Thérapeutique	CONTE (M.)

b) PROFESSEURS A TITRE PERSONNEL :

Biochimie médicale	DESGREZ (P.), POLONOVSKI (J.)
Biologie médicale	BOURLIERE (F.)
Embryologie	TUCHMANN (H.)
Hygiène et médecine préventive	DEPARIS (M.)
Parasitologie	BRUMPT (L.C.)
Pathologie chirurgicale	LAURENCE (G.)
Pharmacologie	LÉVY (Mlle J.)
Physiologie	PARROT (J.)
Physique médicale	KELLERSHOHN (L.)

2° CHAIRES DE SCIENCES CLINIQUES

a) PROFESSEURS TITULAIRES :

MM.

Clinique carcinologique chirurgicale (Necker)	REDON (H.)
Clinique cardiologique (Broussais)	MOUQUIN (M.)
Cliniques chirurgicales :	
<i>Beaujon</i> : LORTAT-JACOB (J.-L.) — <i>Cochin</i> : LÉGER (L.) — <i>Hôtel-Dieu</i> : PATEL (J.)	
— <i>Pitié</i> : CORDIER (G.) — <i>Saint-Antoine</i> : GOSSET (J.) — <i>Salpêtrière</i> : SICARD (A.)	
— <i>Tenon</i> : OLIVIER (Cl.).	
Clinique de chirurgie infantile et orthopédique (Enfants-Malades)	FÈVRE (M.)
Clinique chirurg. orthopédique et réparat. (Cochin)	MERLE D'AUBIGNÉ (R.)
Clinique de chirurgie cardio-vasculaire (Broussais) ..	GAUDART D'ALLAINES (F. DE)
Clinique de chirurgie pleuro-pulmonaire (Laënnec) ..	MATHEY (J.)
Clinique endocrinologique (Pitié)	DECOURT (J.)
Clinique de Génétique médicale (Enfants-Malades) ..	LAMY (M.)
Clinique gynécologique (Broca)	FUNCK-BRENTANO (P.)
Clinique des maladies cutanées et syphilit. (St-Louis)	DEGOS (R.)
Clinique des maladies des Enfants (Enfants-Malades)	CATHALA (J.)
Clinique des maladies infectieuses (Claude-Bernard) .	MOLLARET (P.)
Clinique des maladies mentales et de l'encéphale (Sainte-Anne)	DELAY (J.)
Clinique des maladies métaboliques (Necker)	HAMBURGER (J.)
Clinique des maladies du sang (Broussais)	MARCHAL (G.)
Clinique des maladies du système nerveux (Salpêtrière)	CASTAIGNE (P.)
Cliniques médicales :	
<i>Bouicaud</i> : LENÈGRE (J.) — <i>Broussais</i> : SOULIÉ (P.) — <i>Cochin</i> : JUSTIN-BESANÇON (L.) ;	
<i>BROUET</i> (G.) — <i>Hôtel-Dieu</i> : BARIÉTY (M.) — <i>Lariboisière</i> : SÈZE (S. DE) — <i>Pitié</i> :	
<i>DREYFUS</i> (G.) — <i>Saint-Antoine</i> : KOURILSKY (R.).	
Clinique médicale d'hydrologie thérapeutique et climatologie (Bichat)	DEBRAY (C.)
Clinique médicale propédeutique (Broussais)	GENNES (L. DE)
Clinique médico-sociale du diabète sucré et des maladies de la nutrition (Hôtel-Dieu)	DEROT (M.)
Clinique de neuro-chirurgie (Pitié)	DAVID (M.)
Clinique neurologique (Salpêtrière)	GARCIN (R.)
Cliniques obstétricales :	
<i>Baudelocque</i> : LACOMME (M.) — <i>Foch</i> (Suresnes) : MERGER (R.).	
Clinique obstétricale et gynécologique (Port-Royal) .	VARANGOT (J.)
Clinique ophtalmologique (Hôtel-Dieu)	RENARD (G.)
Clinique oto-rhino-laryngologique (Lariboisière) ..	AUBRY (M.)
Clinique de pédiatrie et de puériculture (Saint-Vincent-de-Paul)	LELONG (M.)
Clinique de pédiatrie sociale (Enfants-Malades) ..	MARIE (J.)
Clinique de pneumo-phthisiologie (Laënnec)	BERNARD (E.)
Clinique de neuro-psychiatrie infantile (Salpêtrière) .	MICHAUX (L.)
Clinique de rhumatologie médicale et sociale (Cochin)	COSTE (F.)
Clinique stomatologique (Pitié)	DECHAUME (M.)
Clinique thérapeutique chirurgicale (Vaugirard) ..	ROUX (M.)
Clinique thérapeutique médicale (Saint-Antoine) ..	LEMAIRE (A.)
Clinique toxicologique	GAULTIER (M.)
Clinique traumatologique	PADOVANI (P.)
Séméiologie médicale	DOMART (A.)
Séméiologie et clinique chirurgicales	POILLEUX (F.)
Clinique urologique (Necker)	COUVELAIRE (R.)
Hygiène et clinique de la première enfance (Trousseau)	TURPIN (R.)

b) PROFESSEURS A TITRE PERSONNEL :

Médecine	BOUR (H.), LHERMITTE (F.), PEQUIGNOT (H.)
-------------------	--

II. — PROFESSEURS SANS CHAIRE, PROFESSEURS AGREGES ET MAITRES DE CONFERENCES-AGREGES

Anatomie :

MM. CABROL (C.); COUINAUD (C.);
GILLOT (C.); OLIVIER (G.).

Anatomie pathologique :

Mlle GAUTHIER-VILLARS (P.), *pr. s. ch.*; MM. ABELANET (R.); BUSSEY (F.); CHOMETTE (G.); GOUYGOU (Ch.), *m. conf.*; NEZELOFF (Ch.); ORCEL (L.); PAILLAS (J.).

Anesthésiologie :

MM. KERN (E.); VOURC'H (G.).

Bactériologie :

MM. BARBIER (P.); CHRISTOL (D.);
LE MINOR (L.); TOURNIER (P.).

Biochimie médicale :

MM. BAULIEU (Et.), *m. conf.*; BOURILLON (R.); CARTIER (P.); DREYFUS (J.-Cl.); GONNARD (P.); KRUH (J.); JÉROME (H.).

Biologie appliquée à l'Education Physique et aux Sports :

M. PLAS (F.).

Carcinologie :

MM. BOIRON (M.); DENOIX (P.);
MATHÉ (G.); SELIGMANN (M.).

Dermato-Syphiligraphie :

MM. CIVATTE (J.); DUPERRAT (B.).

Electro-Radiologie :

M. LEDOUX-LEBARD (G.).

Hématologie :

MM. BESSIS (M.); BILSKI-PASQUIER (G.); DAUSSET (J.); DUHAMEL (G.).

Histologie :

MM. COUJARD (R.), *pr. s. ch.*;
MAROIS (M.); RACADOT (J.).

Hydrologie :

MM. BESANÇON (F.); CORNET (A.).

Hygiène :

MM. BOYER (J.), *pr. s. ch.*; BLANCHER (G.); Mlle CORRE-HURST (L.);
M. SAPIN-JALOUSTRE (H.).

Maladies infectieuses :

MM. BASTIN (R.); DUPONT (V.).

Médecine légale :

MM. DEROBERT (L.), *pr. s. ch.*;
FOURNIER (E.); GUENIOT (M.); HADENGUE (A.).

Médecine du travail :

M. ALBAHARY (C.).

Neuro-chirurgie :

M. PERTUISSET (B.).

Obstétrique :

MM. GRANJON (A.); HERVET (E.);
LE LORIER (G.); LÉVY (J.); MORIN (P.); MUSSET (R.); ROBEY (M.);
SENÈZE (J.); SUREAU (C.); THOYER-ROZAT (J.).

Ophtalmologie :

MM. BRÉGEAT (P.); DUBOIS (A.);
SARAUX (H.).

Orthopédie :

MM. JUDET (R.); MEARY (R.); POSTEL (M.); RAMADIER (J.).

Oto-rhino-laryngologie :

MM. DEBAIN (J.); PIALOUX (P.).

Parasitologie :

MM. GOLVAN (Y.); LAPIERRE (J.).

Pathologie chirurgicale :

MM. BARCAT (J.); BINET (J.-P.);
CAUCHOIX (J.); CERBONNET (G.);
CHATELIN (C.-L.); DUBOST (Ch.);
DUBOST (Cl.); FAUREL (J.); FLABEAU (F.); GARBAY (M.); GARNIER (H.);
GAUDART D'ALLAINES (Cl. de); GERMAIN (A.); LATASTE (J.); LÉVÊQUE (B.);
LOYGUE (J.); MERCADIER (M.); NATALI (J.); PELLERIN (D.); PERROTIN (J.);
ROBERT (H.); THOMERET (G.).

Pathologie exotique :

M. SCHNEIDER (J.).

Pathologie expérimentale :

MM. BENHAMOU (J.-P.); BERTHAUX (P.); BOVIN (P.); CROSNIER (J.);
HARTMANN (L.); LEPEY (J.); MAURICE (J.); MIKOL (Cl.); RICHET (G.).

Pathologie médicale :

MM. AUSSANNAIRE (M.); BOUVIER (J.); BOUVRAIN (Y.); BRICAIRE (H.);
BRISAUD (H.); BROCARD (H.); BUGE (A.); CATINAT (J.); CHRÉTIEN (J.);
COBLENTZ (B.); CONTAMIN (F.); COURY (C.); ETIENNE (J.-P.); FREZAL (J.);
FRITEL (D.); HENNEQUET (A.); HIMBERT (J.); HOUSSET (E.); LAROCHE (Cl.);
LESOBRE (R.); MACREZ (C.); MOREAU (L.); NICK (J.); ROYER (P.);
TOURNEUR (R.); WOLFROMM (R.).

Pédiatrie-Puériculture :

MM. JOSEPH (R.); LAFOURCADE (J.);
LEPERCQ (G.); MANDE (R.); MOZZICONACCI (P.); POLONOVSKI (C.); ROSIER (A.); VIALATTE (J.).

Pharmacologie :

MM. BOISSIER (J.); LECHAT (P.).

Physiologie :

MM. BARRES (G.); DEJOURS (P.);
DURAND (J.); GIRARD, *m. conf.*;
HUGELIN (A.); SCHERRER (J.).

Physique médicale :

MM. CHANTEUR (J.); GOUGEROT (L.), *m. conf.*, *pr. s. ch.*; GREMY (F.), *m. conf.*; MILHAUD (G.); PELLERIN (P.);
ROUCAYROL (J.-Cl.); TUBIANA (M.), *m. conf.*

Pneumo-phthisiologie :
MM. KREIS (B.); MEYER (A.);
RENAULT (P.).

Psychiatrie : M. PICHOT (P.).

Psychiatrie infantile :
MM. DENIKER (P.); DUCHÉ (D.);
FLAVIGNY (H.); LAPRESLE (J.).

Rhumatologie : M. DELBARRE (F.).

Stomatologie :
M. CERNÉA (P.); Mme CHAPUT (A.),
m. conf. agr.; M. GRELLET (M.).

Thérapeutique :
MM. CHASSAGNE (P.); LAMOTTE (M.);
MARCHE (J.).

Urologie :
MM. AUVERT (J.); MOULONGUET (A.);
QUENU (L.).

III. — PROFESSEURS SANS CHAIRE ET AGREGES CHARGES DE COURS DE CLINIQUE ANNEXE A TITRE PERMANENT

Anatomie : M. DEBEYRE (J.).

Clinique chirurgicale :
MM. ABOULKER (P.); AMELINE (A.),
pr. s. ch.; VERNE (J.-M.).

Clinique médicale :
MM. PERRAULT (M.); RAMBERT (P.);
THIEFFRY (S.).

Clinique obstétricale :
MM. GRASSET (J.); MAYER (M.).

Clinique ophtalmologique :
MM. DESVIGNES (P.); OFFRET (G.).

Clinique oto-rhino-laryngologique :
M. MADURO (R.).

Clinique pédiatrique et puériculture :
M. LAPLANE (R.).

Clinique psychiatrique : M. BARUK (H.).

Clinique urologique : M. KUSS (R.).

IV. — PROFESSEURS DETACHES DANS LES UNIVERSITES ETRANGERES

Bactériologie M. HAUDUROY (P.), *prof. sans chaire*

Pathologie chirurgicale M. RUDLER (J.), *prof. sans chaire*

V. — CHARGES DE COURS D'HYGIENE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

M. BOLTANSKI (E.) — M. LAUNAY (C.)

Secrétaire général de la Faculté M. LENA (J.)

Secrétaire principal Mlle CHAINTREUIL (G.)

Conservateur en Chef de la Bibliothèque,
Conservateur du Musée d'Histoire de la
Médecine M. le Docteur HAHN (A.)

Conservateur Mlle DUMAITRE (P.)

Bibliothécaires Mmes CONTET (J.), FORGET (F.),
Mlles LAURENT (H.), LE NOIR (G.),
QUIÉVREUX (E.)

Par délibération en date du 9 décembre 1798, l'Ecole a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées, doivent être considérées comme propres à leurs auteurs et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni improbation.

A MES PARENTS

A MA FEMME

A MES ENFANTS

A MES FRERES ET SOEURS

A MES BEAUX-PARENTS

A TOUTE MA FAMILLE

A MON ONCLE

MONSIEUR LE DOCTEUR Henri DUFLOT

Ancien Externe des Hôpitaux de Paris

Grand Officier de la Légion d'Honneur.

THE SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.
JANUARY 1, 1900

TO THE SECRETARY OF THE
TREASURY

DEAR SIR:

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 28th inst.

and in reply to inform you that the same has been forwarded to the proper authorities for their consideration.

I am, Sir, very respectfully,
Yours,
J. M. McKIM

JOHN MCKIM
Architect
100 Madison Avenue
New York City

A MON MAITRE ET PRESIDENT DE THESE

MONSIEUR LE PROFESSEUR AUBRY

Professeur de Clinique O.R.L. à la Faculté de Médecine
de Paris

O.R.L. de l'Hôpital Lariboisière

Qu'il veuille bien trouver ici

l'expression de notre gratitude

et de notre respectueuse admiration.

THE HALL OF RECORDS

THE HALL OF RECORDS

THE HALL OF RECORDS

THE HALL OF RECORDS

THE HALL OF RECORDS

THE HALL OF RECORDS

THE HALL OF RECORDS

A MON MAITRE

MONSIEUR LE DOCTEUR Marcel OMBREDANNE

O.R.L. de l'Hôpital Necker Enfants Malades

Qui a bien voulu nous faire profiter
de son enseignement ces trois
dernières années.

1. The first

2. The second

3. The third

4. The fourth

5. The fifth

6. The sixth

A MON MAITRE

MONSIEUR LE DOCTEUR Emile PONCET

O.R.L. de l'Hôpital Necker Enfants Malades

En témoignage de notre respectueuse
admiration.

EXHIBIT 10

RECEIVED BY THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C.

EXHIBIT 10

U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE

A MONSIEUR LE DOCTEUR Claude GODDE
Assistant O.R.L. des Hôpitaux de Paris
O.R.L. de l'Hôpital N.D. du Perpétuel Secours

En témoignage de notre respectueux
attachement, nous l'assurons de
notre profonde gratitude.

LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ARRÊTÉ DU 15 JANVIER 1901

RELATIF AU CONCOURS DE LAURÉATS DE L'ÉCOLE NATIONALE D'ARTS ET MÉTIERS

Le Ministre de l'Instruction Publique,

Considérant que le concours de lauréats de l'École Nationale d'Arts et Métiers

est ouvert à tous les candidats français et étrangers

A MES MAITRES D'EXTERNAT :

MONSIEUR LE DOCTEUR Paul ABOULKER
O.R.L. de l'Hôpital Claude Bernard

MONSIEUR LE DOCTEUR HUDELO
O.P.H. de l'Hôpital Bichat

A MONSIEUR LE DOCTEUR GANDON
O.R.L. des Hôpitaux de Paris

A MONSIEUR LE DOCTEUR Stéphane BOULLE
Assistant de Dermatologie à l'Hôpital Saint-Louis

En remerciement de sa contribution dans
la rédaction de ce travail.

A MONSIEUR LE DOCTEUR Lucien PORTE

En le remerciant de la sympathie qu'il
nous a toujours témoignée.

A MESSIEURS LES DOCTEURS POUMAILLOUX

PAILLARD

LEJEMBLE

Attachés O.R.L. de l'Hôpital Necker Enfants Malades.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT

NO. 100

1955

BY

DR. J. H. GOLD

AND

DR. R. M. WATSON

AND

DR. J. H. GOLD

AND

DR. R. M. WATSON

AND

DR. J. H. GOLD

AND

DR. R. M. WATSON

AND

MANIFESTATIONS OTO-RHINO-LARYNGOLOGIQUES
DE LA DERMATITE BULLEUSE MUCO SYNECHIANTE

-:-:-:-:-

STATIONARY ENGINE - 100 HP. 1000 RPM. 1000
STATIONARY ENGINE - 100 HP. 1000 RPM. 1000

1000 RPM. 1000 RPM. 1000 RPM.

approfondi :

I) La description clinique de la localisation oculaire.

L'étude des nombreux travaux consacrés à cette description permet de considérer la symptomatologie oculaire de la maladie comme parfaitement connue depuis son début, jusqu'à son aboutissement extrême : la cécité.

II) Les recherches bactériologiques.

Elles sont nombreuses. Les germes les plus variés ont été retrouvés. Quelques uns ont même été considérés comme responsables de l'affection. On peut conclure à notre ignorance actuelle en ce domaine.

III) Les recherches anatomo-pathologiques.

L'accord est ici loin d'être parfait entre les auteurs.

IV) Les essais thérapeutiques.

Le seul terme d'essai implique à lui seul le caractère aléatoire des résultats obtenus. L'affection malgré les multiples thérapeutiques proposées reste une affection grave dont le pronostic local, absolument imprévisible, doit toujours être réservé. Dans l'état actuel de nos connaissances aucune thérapeutique locale ou générale n'a véritablement fait ses preuves.

Avant d'aborder l'étude de la maladie, se pose pour nous le problème de la limite de notre travail. En effet le "Penphigus Oculaire" ou "Dermatite bulleuse muco-synéchiante" étant une maladie générale, nous ne pouvons parler uniquement des "Manifestations O.R.L.", sans toutefois faire un bref rappel des autres signes de

Section I: General Principles

The purpose of this document is to provide a comprehensive overview of the various aspects of the project. It is intended to serve as a reference for all stakeholders involved in the process. The document is organized into several sections, each addressing a specific area of the project. The first section, "General Principles," outlines the fundamental concepts and objectives that guide the project's execution. This section is followed by a detailed discussion of the project's scope, objectives, and the roles and responsibilities of the various teams involved. The final section of this part discusses the project's timeline and the key milestones that must be achieved to ensure successful completion.

Section II: Project Scope and Objectives

The project's scope is defined by the specific tasks and deliverables that are required to achieve the project's goals. It is essential to clearly define the scope from the outset to avoid any ambiguity or scope creep. The project's objectives are the specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART) outcomes that the project aims to achieve. These objectives are derived from the project's overall purpose and are used to guide the project's execution and to measure its success. The roles and responsibilities of the various teams involved in the project are also clearly defined, ensuring that everyone knows their part in the project and is accountable for their actions. The project's timeline and key milestones are also outlined, providing a clear roadmap for the project's progress.

Section III: Project Management and Control

This section discusses the various tools and techniques used to manage and control the project. It includes a detailed discussion of the project management process, from planning to execution and monitoring. The project management process is a systematic approach to managing the project, ensuring that it is completed on time, within budget, and to the satisfaction of the stakeholders. The project management process is divided into several phases, each with its own set of tasks and deliverables. The project management process is supported by a variety of tools and techniques, including project management software, communication tools, and risk management tools. The project management process is also supported by a variety of control mechanisms, including regular project meetings, status reports, and risk assessments. These control mechanisms ensure that the project is progressing as planned and that any issues are identified and resolved in a timely manner.

Section IV: Project Communication and Reporting

Effective communication is essential for the success of any project. This section discusses the various communication tools and techniques used to ensure that all stakeholders are kept informed of the project's progress. The project communication process is a systematic approach to managing the project's communication, ensuring that all stakeholders are kept informed of the project's progress and that any issues are identified and resolved in a timely manner. The project communication process is divided into several phases, each with its own set of tasks and deliverables. The project communication process is supported by a variety of tools and techniques, including project management software, communication tools, and risk management tools. The project communication process is also supported by a variety of control mechanisms, including regular project meetings, status reports, and risk assessments. These control mechanisms ensure that the project is progressing as planned and that any issues are identified and resolved in a timely manner.

The project communication process is a systematic approach to managing the project's communication, ensuring that all stakeholders are kept informed of the project's progress and that any issues are identified and resolved in a timely manner. The project communication process is divided into several phases, each with its own set of tasks and deliverables. The project communication process is supported by a variety of tools and techniques, including project management software, communication tools, and risk management tools. The project communication process is also supported by a variety of control mechanisms, including regular project meetings, status reports, and risk assessments. These control mechanisms ensure that the project is progressing as planned and that any issues are identified and resolved in a timely manner.

l'affection, oculaires et cutanés, devant lesquels d'ailleurs le diagnostic est le plus souvent évoqué. Après les généralités d'ensemble de l'affection, et avoir relaté notre observation, nous allons essayer à partir de celle-ci et des autres observations déjà publiées de faire une synthèse des "Manifestations O.R.L." de la maladie.

*

*

*

H I S T O R I Q U E

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

L'abondance des travaux consacrés au "PEMPHIGUS OCULAIRE" nous oblige à limiter ce chapitre.

Le premier cas individualisé le fut par VON WICKMANN en 1800; puis nous relevons l'observation isolée d'ALIBERT en 1833. Le Français CADE propose en 1836 le terme de XEROPHTALMIE. WEBER rapporte un nouveau cas en 1868, mais c'est DE GRAFE qui en 1879 fait la première synthèse entre les manifestations oculaires et le pemphigus de la peau et des muqueuses, synthèse confirmée par SATTLER et STEFFAN. Puis les cas publiés deviennent de plus en plus nombreux, rapportant toujours des manifestations oculaires, cutanées et buccales le plus souvent.

*

*

*

1. The first part of the report

2. The second part of the report

3. The third part of the report

4. The fourth part of the report

5. The fifth part of the report

6. The sixth part of the report

7. The seventh part of the report

8. The eighth part of the report

9. The ninth part of the report

10. The tenth part of the report

*

11. The eleventh part of the report

ETIOLOGIE

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Il s'agit d'une maladie relativement peu fréquente :

1 cas pour 14.000 habitants (VILLARD)

1 cas pour 50.000 habitants (SCHOLER ALBRAND)

L'étiologie même de la maladie demeure absolument inconnue.

Sexe

Les auteurs anciens ont voulu voir une légère prédominance du sexe masculin, mais il ne s'agit là que du résultat d'une statistique limitée. Au contraire si nous réunissons dans une même statistique toutes les observations nous remarquons que :

pour un total de 63 cas

il y a : 34 femmes

29 hommes.

Age

Le plus souvent l'affection débute vers la soixantaine

La moyenne d'âge des malades de LEVER est de 60 ans

" " " " " " CHURCH " " 67 ans

" " " " " " HARDY " " 58 ans

Mais le début en est longtemps discret, aussi admet-on que le début réel de la maladie se ferait vers l'âge de 50 à 55 ans.

Race

Aucune particularité nette n'a été observée.

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

- SMI

2000

100-443887-1000

FILED: DELETED BY SA [REDACTED] ON 08-07-2019

1944

574

• **Small Business** • **Entrepreneur**

Origine

Parfaitement inconnue. Un fait mérite néanmoins d'être signalé. Dans 3 observations retrouvées dans la littérature américaine, publiées respectivement par KLAUCHER, HARDY et LAMB), il semble qu'une vaccination génnérienne ait été à l'origine de l'apparition de la maladie. De telles constatations ont pu faire penser à la possibilité d'une origine virale sans qu'aucune preuve n'ait pu y être apportée.

*

*

*

Concentration of inhibitor (mole/l)	Rate of polymerization (mole/l·hr)
0	0.001
0.0001	0.0008
0.0002	0.0006
0.0004	0.0004
0.0006	0.0003
0.0008	0.0002
0.001	0.0001

*

H I S T O L O G I E

--:--:--:--:--:--:--:--:--

Les travaux de A. CIVATTE ont contribué indirectement à l'isolement définitif du Pemphigus Oculaire du cadre des autres pemphigus. En effet les examens histologiques pratiqués ces dernières années ont toujours amené à affirmer qu'histologiquement il ne s'agit pas d'un pemphigus. L'étude histologique du Pemphigus dit oculaire, a bénéficié avons-nous dit indirectement des travaux de CIVATTE qui ont séparé le pemphigus vrai des autres dermatoses bulleuses (pemphigoïdes) en montrant que le pemphigus vrai donne :

- a) un décollement bulleux intra épidermique
- b) un phénomène d'acantholyse

or il se trouve que les lésions histologiques retrouvées au cours de la DERMATITE BULLEUSE MUCO SYNECHIANTE se traduisent toujours par un décollement sous épidermique et surtout exemptes d'acantholyse.

Mais le diagnostic histologique entre les diverses pemphigoïdes à bulle sous-épidermique est plus aléatoire. Toutefois LEVER a insisté sur deux signes différentiels.:

- a) sous la bulle il existe un infiltrat inflammatoire plus dense que dans la maladie de DUHRING, polymorphe, souvent et prédominance plasmocytaire.

- b) sous la bulle également, tendance rapide à la fibrose du derme superficiel témoignant de l'évolution cicatricielle de l'affection.

THE HISTORY OF THE

REIGN OF KING CHARLES THE FIRST

By JOHN BURNET, BISHOP OF SALTSMORE.
 IN TWO VOLUMES.
 LONDON, Printed by J. Streater, at the Sign of the Gun, in St. Dunstons Church-yard, 1680.

THE HISTORY OF THE
 REIGN OF KING CHARLES THE FIRST
 By JOHN BURNET, BISHOP OF SALTSMORE.
 IN TWO VOLUMES.
 LONDON, Printed by J. Streater, at the Sign of the Gun, in St. Dunstons Church-yard, 1680.

c) la bulle est toujours située entre l'épiderme qui est clivé en bloc et le derme. Celui-ci au lieu de conserver la ligne sinueuse de ses papilles comme dans la maladie de DUHRING-BROCQ, semble au contraire devenir anormalement rectiligne.

Le contenu des bulles est le plus souvent clair, parfois semé de cellules où prédominent incontestablement les éosinophiles.

DUPERRAT Obs. N° I

Biopsie des lésions pharyngées : "Importante spongiose épidermique, commençant à la basale et aboutissant à la formation de multiples vésicules confluentes avec une véritable dilacération épidermique".

Cytologie de la bulle : "Présence de rares placards de cellules épithéliales à noyaux réguliers non altérés, à cytoplasme bleu-té, homogène, sans inclusions. Aucun aspect d'acantholyse."

HARDY Obs. N° II

Biopsie de l'épiglotte : "Un revêtement épithélial reposant sur une infiltration inflammatoire interne du chorion autour d'un foyer amyloïde hyperplasié. L'infiltrat inflammatoire est hypervascularisé. Il est polymorphe, contenant quelques plasmocytes, polynucléaires, et il s'accompagne d'une exocytose à l'intérieur de l'épithélium. Pas de décollement bulleux".

GODDE Obs. principale

Biopsie d'une bulle sur la muqueuse buccale. "L'épithélium malpighien qui ne présente aucune anomalie nucléo-cytoplasmique s'est détaché en masse de son support conjonctif. Il s'agit d'un clivage sous épithélial. Ce niveau de décollement bulleux est celui que l'on trouve dans la maladie de LORTAT-JACOB. Il n'y a aucun phénomène d'acantholyse".

*

*

*

Journal of Interpersonal Violence 28(10)br/>Copyright © 2013 Sage Publications
10.1177/0886260513509111
<http://jiv.sagepub.com>

OBSERVATION PERSONNELLE INEDITE

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was plotted against the number of trials for each condition. The number of correct responses increased with the number of trials for all conditions. The number of correct responses was highest for the condition with the highest number of trials (10 trials) and lowest for the condition with the lowest number of trials (2 trials).

- Monsieur F.M.O. Erménégildo - Italien, âgé de 71 ans est vu à la consultation pour la première fois le 13.11.61.
- Il est en fait déjà suivi en ville depuis plus d'un mois, et c'est la difficulté du diagnostic qui motive cette consultation.
- Depuis 3 mois, est apparue assez rapidement - une dysphagie qui a amené le malade à restreindre considérablement son alimentation.
- L'interrogatoire précise que cette dysphagie groupe en fait 2 facteurs :
 - l'un est une douleur lors de la déglutition des aliments siégeant au niveau de l'oro et de l'hypopharynx,
 - l'autre est un spasme de la bouche oesophagienne entraînant un arrêt des aliments lors de la déglutition.
- Divers traitements ont été jusqu'ici en vain institués :
 - des antispasmodiques,
 - une cure de complexes vitaminiques B et PP,
 - un transit oesophagien, enfin a été pratiqué. Il s'est avéré normal,
 - une cure de terramycine enfin instituée, récemment, est demeurée sans effet.
- Dans les antécédents on note :
 - que le malade a été opéré d'un ulcère d'estomac en 1945
 - qu'en fait depuis 1960 sont déjà survenus des épisodes identiques de dysphagie, intermittente qui sans traitement disparaissaient au bout de 15 jours à 1 mois environ. C'est la persistance de l'épisode actuel, son acuité douloureuse qui ont amené le malade à consulter.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

1000 17th Street, New York, N.Y. 10011-1
Telephone: (212) 854-2400

For information on the Library's holdings, please contact the
Reference Department at (212) 854-2400.

The Library is open to the public, and is a place of
learning and research for all.

Stacks are arranged alphabetically by author, and are
open to the public.

The Library also has a large collection of
periodicals and newspapers.

For more information, please contact the
Reference Department at (212) 854-2400.

The Library is a place of learning and research for all.
It is open to the public, and is a place of
learning and research for all.

The Library also has a large collection of
periodicals and newspapers.

Reference

For more information, please contact the
Reference Department at (212) 854-2400.

The Library is a place of learning and research for all.
It is open to the public, and is a place of
learning and research for all.

The Library also has a large collection of
periodicals and newspapers.

For more information, please contact the
Reference Department at (212) 854-2400.

A l'examen

- On constate que toute la muqueuse oro - hypopharyngée - et laryngée est le siège de lésions muqueuses - diffusément réparties.
 - sur une muqueuse diffusément rouge sombre hyperhémisée apparaît un enduit fibrineux - irrégulièrement réparti.
 - celui-ci, par endroit revêt l'aspect de petites plaques blanchâtres, arrondies, de quelques millimètres de diamètre, à peine surélevées. Elles sont séparées les unes des autres par une muqueuse - rouge - hyperhémisée.
 - en d'autres endroits, cet enduit réalise de vastes plaques blanchâtres, frippées, évoquant l'aspect d'une plaque de leucoplasie.
 - ces éléments adhèrent à la muqueuse sous-jacente. On ne les retire au port-coton qu'avec difficulté. Leur ablation laisse une muqueuse sous-jacente, légèrement érodée, laissant sourde un minime suintement sanglant.
 - enfin un 3ème élément peut être noté qui semble être le résultat évolutif des précédents : des brides fibreuses de taille variable, rétractant la muqueuse du voisinage.

Ainsi constate-t-on :

1) Au niveau de l'oro-pharynx

- a) sur la face interne des joues et sur la région de la commissure inter maxillaire :
 - des plaques ovalaires de 5 à 10 millimètres de diamètre.
- b) dans la région intermaxillaire gauche : une bride fibreuse rétractile, blanchâtre, qui s'étend verticalement sur 2 cm de hauteur environ.

c) sur le voile du palais coexistent :

- des éléments de tailles minimes
- et une grande plaque étendue au-dessus de la luette

d) les loges amygdaliennes sont méconnaissables

- dont le tissu lymphoïde amygdalien a disparu bien que le malade affirme n'avoir jamais subi d'amygdalectomie.
- au niveau des loges on constate la coexistence
 - de vastes plaques - blanchâtres pseudo-leucoplasiques
 - et de brides fibreuses, rétractiles - rendant le voile asymétrique.
- le voile du palais apparaît dans son ensemble - peu mobile - attiré en haut et en arrière.
- l'isthme du gosier apparaît rétréci par une attraction du pilier postérieur qui adhèrent à la paroi pharyngée par des brides fibreuses - qui l'attirent vers la ligne médiane.
- le reste de la cavité buccale : langue
gencives
apparaît normal.

2) La Rhinoscopie postérieure

- rendue difficile par la rétraction du voile du palais
- montre qu'il existe également des brides fibreuses rétrécissant le naso-pharynx.

1. The first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

3) L'hypopharyngoscopie indirecte montre :

a) que la paroi postérieure de l'hypopharynx

- est le siège de plaques blanchâtres identiques
- que les gouttières pharyngolaryngées sont intactes
- qu'il existe plusieurs éléments dans la région rétro-aryténoïdienne.

b) au niveau du larynx. On constate :

α) dans l'ensemble : des modifications importantes de la morphologie laryngée, coexistant avec une mobilité laryngée relativement

β) en particulier : la coexistence de lésions évolutives et cicatricielles s'y individualise avec une netteté toute particulière.

- les lésions prédominent sur le vestibule laryngé

- alors que la région glottique, sous glottique et la muqueuse trachéale s'avèrent normales.

a) l'épiglotte : apparaît non oedématisée, son bord libre apparaît normal, ainsi que sa face laryngée. Par contre il existe un volumineux élément sur sa face linguale.

b) les bandes ventriculaires apparaissent rouges, semées d'un piqueté blanchâtre.

c) Mais surtout on constate au niveau des 2 replis ary-épiglottiques l'existence de brides cicatricielles qui sténosent l'orifice supérieur du larynx, s'étendant des bords latéraux de l'épiglotte qui est basculée en arrière, aux aryténoïdes réduites à une sorte de trou-seau fibreux recouverte d'une muqueuse blanchâtre rétractile.

1) Le rôle de la culture

2) Le rôle de la culture

3) Le rôle de la culture

4) Le rôle de la culture

5) Le rôle de la culture

6) Le rôle de la culture

7) Le rôle de la culture

8) Le rôle de la culture

9) Le rôle de la culture

10) Le rôle de la culture

11) Le rôle de la culture

12) Le rôle de la culture

13) Le rôle de la culture

14) Le rôle de la culture

15) Le rôle de la culture

16) Le rôle de la culture

17) Le rôle de la culture

18) Le rôle de la culture

19) Le rôle de la culture

20) Le rôle de la culture

21) Le rôle de la culture

22) Le rôle de la culture

23) Le rôle de la culture

24) Le rôle de la culture

25) Le rôle de la culture

26) Le rôle de la culture

27) Le rôle de la culture

- Lors de la phonation, tout ce processus fibreux se tend, semblant limiter les mouvements d'abduction des aryténoïdes, les cordes, bien que morphologiquement normales, ne se joignent pas en arrière, expliquant la dysphonie légère, notée chez ce malade.

4) La Rhinoscopie antérieure ne montre aucune anomalie de la pituitaire.

Conclusions : Devant ce tableau aucun diagnostic précis n'est porté, et le malade est hospitalisé pour mise en observation et examens complémentaires :

A) Les examens complémentaires eurent surtout le mérite d'éliminer divers diagnostics tour à tour envisagés.

1 - Un prélèvement fut fait au niveau des lésions

a) l'examen bactériologique releva la présence streptococque non hémolytique et après culture sur milieux spéciaux de levure type candida. Ce qui fit penser, un instant à la possibilité d'une mycose : bien qu'un traitement par antibiotique antifongique demeurât sans effet.

b) un examen après coloration par méthode de Papanicolaou : montra la présence de "quelques plages d'une substance homogène d'aspect albumineux parsemées de quelques polynucléaires neutrophiles, et quelques cellules épithéliales. Absence de cellules suspectes ou de formation parasitaire" (Dr Et. MARTIN).

1016

1. ANALYSIS OF

2 - La formule sanguine montra :

Globules rouges : 4.280.000

Globules blancs : 7.120

Hémoglobine : 100 %

Valeur globulaire : 1,28

Formule leucocytaire : Polynucléaires 54 %

Neutrophiles 53 %

Eosinophiles 1 %

Basophiles 0

Mononucléaires 46 %

Lymphocytes 32 %

Monocytes 14 %

3 - La vitesse de sédimentation : normale

4 - Les diverses recherches sérologiques de la syphilis s'avérèrent également négatives.

5 - De même une radio pulmonaire montrant l'intégrité du parenchyme permit d'éliminer la possibilité d'une granulie froide un instant envisagée.

6 - Enfin un bilan protidique donna les résultats suivants :

Protides totaux : 60 g par litre

Albumine : 30 g par litre

Globuline : 30 g par litre

Rapport Albumine
sur Globuline : 1

L'électrophorèse donnait des résultats sensiblement normaux :

Albumine	: 45 %	Globuline	α 1 5 %
			α 2 10,5 %
			β 14,5 %
			γ 25 %

1 - la version de l'annuaire

1990, 1991, 1992

1993, 1994, 1995

1996, 1997, 1998

1999, 2000, 2001

2 - la version de l'annuaire

1990, 1991, 1992

1993, 1994, 1995

1996, 1997, 1998

1999, 2000, 2001

2002, 2003, 2004

2005, 2006, 2007

3 - la version de l'annuaire

4 - la version de l'annuaire

5 - la version de l'annuaire

6 - la version de l'annuaire

7 - la version de l'annuaire

8 - la version de l'annuaire

9 - la version de l'annuaire

10 - la version de l'annuaire

11 - la version de l'annuaire

12 - la version de l'annuaire

13 - la version de l'annuaire

14 - la version de l'annuaire

15 - la version de l'annuaire

16 - la version de l'annuaire

17 - la version de l'annuaire

18 - la version de l'annuaire

19 - la version de l'annuaire

B) Ce fut en fait l'évolution qui nous permit de faire le diagnostic .

- lors des examens quotidiens. Il était frappant de voir le caractère passager des éléments muqueux changeant d'aspect et de siège d'un jour à l'autre.
- tel endroit muqueux, encore sain hier, se recouvrant aujourd'hui d'une plaque caractéristique.
- tel autre se transformant en quelques jours en une bride fibreuse.
- Mais le diagnostic ne fut fait avec certitude que le matin, où, écartant la face interne d'une joue à l'aide d'un abaisse-langue nous avons eu la surprise, en retirant ce dernier, d'assister à la naissance d'une bulle, soulevant en quelques instants la muqueuse.
 - d'un diamètre de 1 cm environ
 - contenant un liquide transparent
 - que nous nous apprêtions à prélever, lorsque celle-ci creva immédiatement laissant une de ces membranes blanchâtres qui nous intriguait depuis si longtemps.

I - Le diagnostic fut fait essentiellement par l'examen ophtalmologique

qui montra l'existence au niveau de l'oeil gauche, d'une synéchie conjonctivale étendue, n'entraînant encore :

- ni trouble de la vision, la cornée restant intacte.
- ni trouble de la motilité oculaire.

II - La consultation de dermatologie :

aucun élément cutané ne fut trouvé.

III - La biopsie :

clivage sous-épithélial, absence d'acantholyse.

C) Ce diagnostic établi, nous pratiquâmes à ce malade :

- une bronchoscopie
- une oesophagoscopie.

α) la Bronchoscopie : montra l'intégrité de la muqueuse trachéo-bronchique

β) une oesophagoscopie : fut pratiquée à 2 reprises.

- En effet une première tentative ne nous permit pas de préciser les lésions.
- la lumière oesophagienne, dès le franchissement de la bouche se montrait totalement obstruée par des fausses membranes blanchâtres, qui empêchaient tout examen, et qu'il fallait retirer à l'aide de l'aspirateur et d'une pince à corps étranger. Au bout de quelques centimètres de progression nous dûmes abandonner.
- Une deuxième tentative fut faite 2 semaines plus tard : dans des conditions plus favorables où il a été possible de passer un tube d'oesophagoscopie jusqu'au cardia, sans difficultés.

Sur tout le trajet du tube : des lésions identiques ont été retrouvées : faites d'hyperhémie muqueuse et de membranes blanchâtres la recouvrant par taches arrondies. Au contact du tube, des membranes étaient arrachées, démasquant une muqueuse érodée.

1. Introduction

The purpose of this study is to investigate the effects of the proposed system on the performance of the system.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

The system is designed to provide a comprehensive overview of the system's performance.

Conclusions : Nous suivons ce malade depuis Novembre 1961.

Jusqu'à présent, toute tentative thérapeutique s'est avérée illusoire.

Sur le conseil des dermatologistes nous avons mis notre malade à la chloroquine.

Est-ce une coïncidence ou un effet du traitement ? Dans les semaines qui suivirent la dysphagie s'atténua considérablement au point de permettre une alimentation pratiquement normale.

Cliniquement : alors que nous ne constatons aucune modification appréciable de l'oro pharynx à des examens successifs, il est à noter que la seconde oesophagoscopie qui, semblait montrer une régression appréciable des lésions par rapport à la première, a été pratiquée après 15 jours de traitement à la chloroquine.

Il ne nous semble pas d'ailleurs possible de conclure sur une telle constatation, les observations que nous avons dépouillées, sont assez imprécises quand à l'évolution du pemphigus.

Mais si nous nous en référons au cas qui fait l'objet de cette observation, il semble bien que ce pemphigus puisse évoluer par poussée : comme en témoigne les incidents de dysphagie intermittente qu'a présenté notre malade depuis 1960. Peut-être l'amélioration actuelle n'est-elle qu'un intervalle entre 2 poussées, sans que la thérapeutique instituée en soit responsable.

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..
... ..
... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

qui amènent le malade à consulter. En effet l'atteinte de la muqueuse buccale - est la première en date pour :

LEVER	dans	26 %	des cas
CHURCH	"	71 %	" "
HARDY	"	72 %	" "

II) L'atteinte de la muqueuse pharyngée :

Elle est toujours associée à l'atteinte buccale.

III) L'atteinte de la muqueuse nasale :

Bien que fréquente elle est néanmoins moins souvent retrouvée que les manifestations bucco-pharyngées. Les statistiques diffèrent d'ailleurs énormément suivant les différents auteurs.

23 cas sur les 63 observations (36 %)

Parmi ces cas :

HARDY	en note	7	pour	11	soit	63 %
CHURCH	"	"	1	"	7	" 14 %
LEVER	"	"	5	"	19	" 26 %
DUPERRAT	"	"	1	"	3	" 33 %

Certains faits sont toutefois à signaler. C'est que :

a) les examens rhinoscopiques n'ont pas été effectués sur tous les malades ou n'ont pas prêté à compte-rendu.

b) parmi les observations les plus détaillées que nous avons recueillies, c'est à dire celles de LEVER, on note une fréquence de 63 %.

c) il s'agit d'une affection atteignant surtout les muqueuses.

Tout ceci fait que la fréquence globale de 36 % des cas en ce qui concerne la localisation nasale est sûrement inférieure à la réalité.

THE UNITED STATES OF AMERICA

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C. 20250

FOURTH DISTRICT

WATER RESOURCES DIVISION

REPORT OF THE DIVISION

FOR THE YEAR ENDING

1964

BY THE DIVISION

OF THE BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C.

FOR THE YEAR ENDING

1964

BY THE DIVISION

OF THE BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C.

FOURTH DISTRICT

FOR THE YEAR ENDING

1964

BY THE DIVISION

OF THE BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C.

FOURTH DISTRICT

FOR THE YEAR ENDING

1964

BY THE DIVISION

OF THE BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C.

IV) L'atteinte de la muqueuse laryngée :

Ici encore dans le tableau récapitulatif nous notons :

- que 25 cas sur les 63 soit 39 % présentent une atteinte de la muqueuse laryngée. Les mêmes remarques que celles faites à l'occasion des manifestations nasales peuvent être faites en ce qui concerne les manifestations laryngées.

CHURCH 28 % de ses cas

DUPERRAT 33 % de ses cas

HARDY 54 % de ses cas

V) L'atteinte de la muqueuse trachéale :

Celle-ci n'a été signalée qu'une seule fois par MONTFORT.

VI) L'atteinte de la muqueuse oesophagienne :

La fréquence de l'atteinte est ici encore plus difficile à chiffrer car :

- a) la dysphagie dont se plaignent la plupart des malades étant haut située peut être imputée aussi bien à l'atteinte laryngée qu'oesophagienne.
- b) très rares sont les observations où l'on retrouve des comptes-rendus d'oesophagoscopie ou de radiographie de l'oesophage.

Si nous nous en tenons à la dysphagie nous retrouvons que :

26 malades sur 63 s'en plaignent (31 %)

et parmi ces 26 seuls 10 malades ont été l'objet d'investigations cliniques (radio, oesophagoscopie).

et sur ces 10 cas tous les 10 (soit 100 %) ont mis en évidence des lésions de la muqueuse oesophagienne.

*

*

*

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

[illegible]

[Faint handwritten notes and markings across the bottom of the page]

● 17

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{1}{n} = 0$$

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607

TO THE EDITOR:
I am writing to you to inform you
of the results of my research
on the properties of the
newly discovered element.
The results are very interesting
and I hope you will find them
of interest.

Respectfully,
[Signature]

Enclosed for you are two copies
of the report of my research
on the properties of the
newly discovered element.
I hope you will find them
of interest. I am sure
that the results of my research
will be of great value to
the scientific community.
I am sure that the results
of my research will be of
great value to the scientific
community. I am sure that
the results of my research
will be of great value to
the scientific community.

I am sure that the results
of my research will be of
great value to the scientific
community. I am sure that
the results of my research
will be of great value to
the scientific community.

a) leurs aspects : ils sont extrêmement polymorphes variables d'un jour à l'autre, rares 1 cas sur 2 fixes, récidivants in situ, parfois il s'agit :

- parfois il peut encore s'agir :

- b) leurs sièges : les plus fréquents sont :

- c) généralement, plus tardifs que l'atteinte muqueuse.

d) le signe de Nicholsky est inconstant.

LES LOCALISATIONS GENITALES

[illegible]

Nous ne ferons que les signaler pour mémoire.

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

LES LOCALISATIONS AUX MUQUEUSES DU DOMAINE O.R.L.

Nous allons étudier successivement les diverses localisations buccales, pharyngées, nasales, laryngées, trachéales, et oesophagiennes. Pour chacune d'elles :

- après avoir repris les passages de quelques observations typiques intéressant la dite localisation.
- nous ferons une synthèse :
 - . des signes fonctionnels
 - . des signes physiques.
- nous évoquerons l'évolution.

1. The first part of the report is devoted to a general

description of the object of the study and the methods used.

2. The second part of the report is devoted to a detailed

description of the results of the study and the conclusions drawn.

3. The third part of the report is devoted to a discussion

of the results of the study and the conclusions drawn.

4. The fourth part of the report is devoted to a summary

of the results of the study and the conclusions drawn.

5. The fifth part of the report is devoted to a summary

of the results of the study and the conclusions drawn.

6. The sixth part of the report is devoted to a summary

LA LOCALISATION BUCCALE

Figure 6

Nous allons donner la description de quelques passages d'observations.

DUPERRAT Obs. N° 1

SECTION 1
[Illegible text]

[Illegible text]

SECTION 2

[Illegible text]

SECTION 3

SECTION 4

[Illegible text]

SECTION 5

SECTION 6

[Illegible text]

HARDY Obs. N° 8

" ... plaques érosives permanentes sur la langue, les gencives, le palais "

A l'étude de ces cas et de toutes les autres observations nous relevons pratiquement toujours les mêmes lésions :

A) Signes fonctionnels

Il s'agit toujours de douleurs superficielles à type de brûlures, de cuissons,
exagérées par la mastication et le contact des aliments.
Sensibilité accrue aux acides,
localisées au niveau des lésions.

B) Signes physiques

Dans la plupart des cas il s'agit de la lésion essentielle : la bulle. Elle est éphémère (quelques heures) mais nette, bien tendue.

Souvent également la bulle est rompue et l'on voit des nappes érosives, rouges ; arrondies ou ovalaires, douloureuses au contact du porte-coton.

Toutefois l'on a pu également rencontrer des lésions moins évocatrices où le diagnostic a été évoqué devant l'atteinte d'autres muqueuses. C'est ainsi qu'il a été décrit :

- . un aspect leuco kératosique (LEVER Obs. 17)
- . un aspect pseudo membraneux (LANNOIS et CURTYL)
- . de vastes lambeaux flottants sur une muqueuse érythémateuse (DUPERRAT Obs. 2)

... " ...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

Ces lésions siègent le plus souvent :

. par endroits préférentiels décroissants :

au palais

à la face interne des joues

sur le versant muqueux des lèvres

dans le sillon gingivo-jugal

dans le sillon gingivo-lingual

à la langue.

C) Evolution

Celle-ci se fait inexorablement à la longue vers :

l'atrophie

les synéchies

Cette évolution entraîne progressivement : la formation de brides cicatricielles linéaires ou étoilées, rétractant et plissant la muqueuse buccale atrophiée, diminuant la profondeur des sillons gingivaux, diminuant à la longue l'amplitude de l'ouverture de la bouche par la formation de synéchies au niveau des commissures labiales.

*

*

*

LA LOCALISATION PHARYNGEE

[illegible]

Enoncé de quelques observations.

DUPERRAT Obs.: 1

" ... L'examen du pharynx révèle des cicatrices scéro-atrophiques sur les deux piliers du voile; une zone érosive arrondie à la jonction des parois postérieures et latérale du pharynx. Le voile apparaît rétracté. Il existe une bride cicatricielle sur le pilier droit qui provoque une déviation de la luette. Les loges amygdaliennes sont très profondes. Les piliers ont un aspect fibreux cicatriciel. Sur la face postérieure du pharynx existe une petite crête vers laquelle convergent des replis fibreux ... "

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

HARDY Obs. 1

" ... Aspect érosif diffus du rhino pharynx, pas de lésions bulleuses franches. Quelques mois plus tard on note sur la paroi postérieure du pharynx, une petite croutelle, reliquat d'une bulle. Brûlures pharyngées incessantes. 4 ans plus tard : aspect atrophique de l'ensemble du carrefour pharyngo-laryngé. Disparition des piliers antérieurs du voile "... "

• • •

HARDY Obs. 4

" ... Le pharynx revêt un aspect bien particulier par symphyse des piliers postérieurs à la partie moyenne de la paroi pharyngée postérieure soudant ainsi le voile membraneux au pharynx.

Un an plus tard : aspect tantôt érosif tantôt atrophique de l'ensemble de la muqueuse pharyngée qui est sèche ... "

0000 0000 0000 0000 0000 0000

HARDY Obs. 7

" ... Impression de réduction d'ensemble de la cavité buccale; douleurs diffuses. Le pharyngo-larynx ne peut être examiné ... "

HARDY Obs. 11

" ... Femme de 55 ans qui présente des signes d'irritation pharyngo-laryngée. On constate de nombreuses fausses membranes blanchâtres sur le pharynx, entourées par une zone inflammatoire. Plusieurs éléments post bulleux sur le bord libre du voile et des piliers postérieurs. La luette est à peu près inexistante sans que l'on puisse préjuger de son étiologie. Au miroir nombreux éléments dans l'hypopharynx et les sinus pyriformes ... "

A l'étude de toutes les observations relevées l'on peut donner les quelques notions suivantes sur la localisation au pharynx de la maladie.

A) Signes fonctionnels

Ce sont toujours les mêmes :

- . difficultés à avaler
- . douleurs à la déglutition
- . sensation de cuisson, de brûlures pharyngées
- . sécheresse pharyngée
- . sensation de gêne.

B) Signes physiques

Divers aspects peuvent être rencontrés :

Souvent il s'agit de la bulle :

Souvent également des nappes érosives :

Quelquefois les auteurs ont noté la présence :

- . de croûtes post bulleuses
- . de fausses membranes blanchâtres
- . de placards blanchâtres
- . de minces lambeaux épidermiques flottants
séquelles de bulles rompues.

C) Evolution

Comme pour toute l'affection, l'évolution locale se fait vers l'atrophie progressive et la formation de synéchies.

On note, comme ailleurs, la formation de brides cicatricielles rétractiles sur une muqueuse amincie.

Cette évolution, qui se fait par poussées successives, entraîne les modifications d'aspect suivants que nous avons pu relever dans l'ensemble des divers cas publiés :

- . Aspect fibreux cicatriciel des piliers du voile qui apparaissent amincis.
- . Replis fibreux de la paroi postérieure du pharynx.
- . Disparition des piliers antérieurs du voile.
- . Synphyse des piliers postérieurs à la face postérieure du pharynx, entraînant une réduction d'ensemble de la cavité buccale et rendant pratiquement impossible toute rhinoscopie postérieure.

ANNEXE 1

1. Introduction

2. Objectifs de l'étude

3. Méthodologie

4. Résultats

5. Conclusion

6. Bibliographie

7. Annexes

8. Références

9. Remerciements

10. Conclusion

11. Bibliographie

12. Annexes

13. Références

14. Remerciements

15. Conclusion

16. Bibliographie

17. Annexes

18. Références

19. Remerciements

20. Conclusion

21. Bibliographie

22. Annexes

23. Références

24. Remerciements

25. Conclusion

26. Bibliographie

. Amputation plus ou moins étendue de la luette.

Une remarque nous a frappé : en effet deux auteurs signalent des modifications au niveau des formations lymphoïdes :

a) disparition totale des anygdales pharyngées; les loges anygdaliennes sont profondes, deshabitées chez une jeune fille de 17 ans qui n'a pas subi d'amygdalectomie.

b) disparition des follicules lymphoïdes de la face postérieure du pharynx qui devient lisse et sèche.

Faut-il faire abstraction de cette remarque ou au contraire y voir une orientation possible pour les recherches étiologiques... ?

*

*

*

Journal of the American Medical Association

Published Weekly, except on Sundays, and on the last day of the month

Subscription price, \$5.00 per annum in advance

Single copies, 15 cents

Entered as Second-Class Matter, October 3, 1917, Post Office at Chicago, Ill., under No. 100,000

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on July 1, 1918

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices

Postmaster: Send address changes to JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Copyright, 1918, by American Medical Association

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

*

*

LA LOCALISATION NASALE

[illegible]

Ici encore conformément à notre plan nous allons examiner quelques observations, mettant en évidence les manifestations nasales.

HARDY Obs. N° 4

" ... Femme de 55 ans qui se plaint de prurit des ailes du nez entraînant grattage, suintement et formation de croûtes dont la chute provoque une épistaxis. Jamais de bulles franches. A l'examen on note sur les ailes du nez la présence de lésions croûteuses sèches mal limitées, d'aspect hémorragique, entourées d'une zone érythémateuse et siégeant dans le sillon nasal. L'examen O.R.L. met en évidence :

" ... une muqueuse nasale atone, saignant au moindre contact; une rhinite atrophique à tendance ozéneuse. Sur le septum, à gauche, et sur la tête du cornet moyen, présence de petites formations nodulaires de nature imprécises ... "

Nouvel examen 3 ans plus tard : " ... les deux fosses nasales sont encombrées de croûtes très adhérentes. La muqueuse de la cloison est altérée et saigne au contact. Il existe une petite ulcération à gauche au niveau de la tache vasculaire. L'aspect des cornets et la béance des fosses nasales évoquent une rhinite atrophique. On note par ailleurs une synéchie de l'aile nasale ... "

Nouvel examen 1 an après : " ... les lésions apparaissent
bourgeonnantes, infiltrées. On suspecte un épithélioma. Biopsie :
Epithélioma spino cellulaire très renanié ... "

Nouvel examen 1 an après : " ... le vestibule est rétréci au niveau de sa voute. La muqueuse est blanche avec aspect pseudo-ozéneux et présence de nombreuses croûtes ... "

BLONDEL et BONHOMME

" ... Homme. 52 ans. Examen O.R.L. : la fosse nasale droite est étroite et imperméable à l'air. Le cornet inférieur touche la cloison. La partie antérieure de la cloison est couverte d'un enduit pseudo-membraneux peu épais avec bords sanglants. La fosse nasale gauche perméable. La partie visible de la cloison présente un aspect pseudo-membraneux avec un piqueté sanguin. Le cornet inférieur est couvert de croûtes sanguinolentes. Les sinus sont clairs ... "

Un nouvel examen un an après : " ... la fosse nasale droite est devenue perméable mais l'espace libre est étroit, ceci est conditionné par le squelette. Le cornet inférieur droit est pâle, peu turgescent sans lésions appréciables. La fosse nasale gauche est très large avec atrophie très nette de la muqueuse dans tout son ensemble. Le cornet inférieur a disparu. La muqueuse est sèche comme chez les rhinatrophiques ... "

HARDY Obs. N° 7

" ... Le vestibule est rétréci par un pont cicatriciel en arche au sommet du vestibule. Aspect croûteux comblant presque totalement la fosse nasale droite; la muqueuse apparait par places, tantôt blanchâtre, atrophique, tantôt érosive saignante ... "

I have been thinking of you very much lately, and wondering how you are getting on. I hope you are well and happy. I have been very busy lately, but I always find time to think of my friends.

My dear friend,

I have been thinking of you very much lately, and wondering how you are getting on. I hope you are well and happy. I have been very busy lately, but I always find time to think of my friends. I have been thinking of you very much lately, and wondering how you are getting on. I hope you are well and happy. I have been very busy lately, but I always find time to think of my friends.

I have been thinking of you very much lately, and wondering how you are getting on. I hope you are well and happy. I have been very busy lately, but I always find time to think of my friends. I have been thinking of you very much lately, and wondering how you are getting on. I hope you are well and happy. I have been very busy lately, but I always find time to think of my friends.

Yours truly,

I have been thinking of you very much lately, and wondering how you are getting on. I hope you are well and happy. I have been very busy lately, but I always find time to think of my friends. I have been thinking of you very much lately, and wondering how you are getting on. I hope you are well and happy. I have been very busy lately, but I always find time to think of my friends.

DUPERRAT Obs. N° 1

" ... A l'entrée dans le service on constate une déformation du nez en pied de marmite dont le début remonterait à un an et demi à la suite d'un coryza douloureux ayant entraîné une déformation du nez. La muqueuse est pâle, atrophique, se rétractant mal à la cocaïne. La cloison cartilagineuse est mince, presque réduite à la muqueuse ... "

Après l'étude de toutes les observations recueillies nous allons résumer les divers signes de la localisation nasale de l'affection :

A) Signes fonctionnels

- . picotements, enchyphrèment;
- . coryza douloureux
- . sécrétions sanguinolentes
- . épistaxis à répétitions

B) Signes physiques

La majorité des auteurs sont d'accord pour retrouver le plus fréquemment :

- . une muqueuse pâle, atrophique, saignant facilement
- . la présence de croûtes
- . moins souvent que pour les localisations buccale et pharyngée on découvre :
 - . des nappes érosives
 - . la bulle caractéristique (1 seule fois)
- . un aspect de rhinite atrophique.

C) Evolution

Elle a pour aboutissement inévitable : atrophie de la muqueuse et synéchies.

- . atrophie d'ensemble de la muqueuse
- . destruction des cartilages
- . perforation de la cloison
- . disparition des cornets inférieurs
- . synéchies entre les cornets et la cloison
- . synéchies au niveau des orifices narinaires
- . synéchies du vestibule, de l'auvent nasal.

Signalons que dans son Obs. N° 10 HARDY a noté une rhinite hypertrophique avec synéchie entre cornet moyen et cloison et une anosmie. Il semble que ce soit un cas exceptionnel ...

On ne peut manquer également d'être frappé dans l'Obs. N° 4 de HARDY de la survenue, 5 ans après le début de l'affection d'un épithélioma spino cellulaire très renanié sur les lésions nasales. S'agit-il d'une pure coïncidence ou d'un processus évolutif inconnu de la maladie ... ?

*

*

*

3) Examen

Il y a deux sortes de questions : théoriques et pratiques.

Les questions théoriques sont :

1. Quelles sont les fonctions du système digestif ?

2. Quelles sont les fonctions du système respiratoire ?

3. Quelles sont les fonctions du système circulatoire ?

4. Quelles sont les fonctions du système excréteur ?

5. Quelles sont les fonctions du système reproducteur ?

6. Quelles sont les fonctions du système nerveux ?

7. Quelles sont les fonctions du système endocrinien ?

Les questions pratiques sont :

1. Dessiner le schéma d'un système digestif.

2. Dessiner le schéma d'un système respiratoire.

3. Dessiner le schéma d'un système circulatoire.

4. Dessiner le schéma d'un système excréteur.

5. Dessiner le schéma d'un système reproducteur.

6. Dessiner le schéma d'un système nerveux.

7. Dessiner le schéma d'un système endocrinien.

LA LOCALISATION LARYNGEE

--:--:--:--:--:--:--:--:--:--

Quelques passages des observations publiées :

HARDY Obs. N° 11

" ... Femme. 45 ans. Examen au miroir laryngé net en évidence de nombreux éléments érosifs post bulleux sur le bord libre de l'épiglotte. Une biopsie d'un élément a été effectué .. (voir histologie) ... "

HARDY Obs. N° 8

" ... Femme. 55 ans. Cinq ans après le début buccal de la maladie tout le vestibule laryngé est le siège d'une infiltration oedémateuse avec muqueuse pâle, ulcérée par placards. Ces ulcérations sont multiples, superficielles et responsables d'une dyspnée laryngée d'origine sténosante. Troubles de la déglutition.

LANNOIS et CURTYL

" ... Homme. 69 ans. Au niveau du larynx on note des lésions sur l'épiglotte. A la face antérieure plusieurs taches blanches sur un fond rouge. Les bords supérieurs des deux aryénoïdes sont également recouverts d'un placard de même nature. Quant aux cordes vocales elles sont grosses, rouges, sans autre lésion. Peu de troubles fonctionnels.

HARDY Obs. N° 4

" ... laryngites fréquentes; raucité de la voix. Les lésions laryngées portent sur la couronne laryngée. L'épiglotte est épaissie, infiltrée, d'aspect cicatricielle avec un ou deux points jaunâtres

LA LOI SUR LE DROIT DE VUE

— 1911 —

Les lois sur le droit de vue :

1911

1911. 45 ans. Les lois sur le droit de vue ont été publiées :

1911. Les lois sur le droit de vue ont été publiées :

1911. Les lois sur le droit de vue ont été publiées :

1911

1911. 45 ans. Les lois sur le droit de vue ont été publiées :

1911. Les lois sur le droit de vue ont été publiées :

1911. Les lois sur le droit de vue ont été publiées :

1911. Les lois sur le droit de vue ont été publiées :

1911. Les lois sur le droit de vue ont été publiées :

1911

1911. 45 ans. Les lois sur le droit de vue ont été publiées :

1911. Les lois sur le droit de vue ont été publiées :

1911. Les lois sur le droit de vue ont été publiées :

1911. Les lois sur le droit de vue ont été publiées :

1911. Les lois sur le droit de vue ont été publiées :

1911

1911

1911. 45 ans. Les lois sur le droit de vue ont été publiées :

1911. Les lois sur le droit de vue ont été publiées :

1911. Les lois sur le droit de vue ont été publiées :

évoquant un peu l'aspect d'un lupus guéri. Les aryténoïdes et les replis ary-épiglottiques sont infiltrés; les cordes vocales sont bien mobiles. Les bandes ventriculaires blanchâtres, hypertrophiées. Six ans après, toute la couronne laryngée est oedématisée ce qui pourrait expliquer la dysphagie haute dont se plaint le malade. L'ensemble de la muqueuse est pâle, atrophique, mais présente de nombreuses nappes érosives qui pourraient être post-bulleuses. Les cordes vocales sont normales mais la voix a des périodes de modifications de tonalité ... "

HARDY Obs. N° 7

" ... irritation laryngée entraînant une toux rebelle à l'occasion de laquelle le malade "crache des peaux" ... "

MONTFORT Obs. N° 13

" ... épiglote et cartilages aryténoïdes sont rouges. Les cordes vocales, grises, épaissies. Le sujet présente un enrrouement. L'ouverture du larynx se rétrécit peu à peu. La muqueuse s'épaissit. L'épiglotte s'étale de plus en plus. Les cordes vocales s'altèrent à la partie postérieure ... "

De par ces quelques extraits d'observations et l'étude des autres cas on peut classer les différents signes cliniques de la localisation au larynx de la maladie.

A) Signes fonctionnels

Les signes retrouvés sont presque toujours les mêmes :

- . douleurs laryngées entraînant une dysphagie
- . laryngites fréquentes

- . enrrouement, toux
- . dysphonie, à l'extrême aphonie (HARDY N° 5)
- . dyspnée

B) Signes physiques

Ici, il a souvent été décrit la présence de :

- . la bulle classique
- mais également :
- . des érosions superficielles
 - . des taches blanchâtres sur fond de muqueuse rouge, voire même de fausses membranes
 - . des petits points jaunâtres.

Les sièges des lésions les plus souvent retrouvés sont :

- . l'épiglotte : bord libre
- . aryténoïdes
- . replis ary-épiglottiques
- . rarement les cordes vocales

C) Evolution

Dans cette localisation laryngée l'évolution est beaucoup plus marquée, non pas tellement par l'atrophie d'ensemble mais par les rétractions cicatricielles qui ont ici une action sténosante :

- . diminution de l'espace inter-aryténoïdien
- . rétraction des replis ary-épiglottiques
- . amincissement et attraction de l'épiglotte en arrière.

LA LOCALISATION TRACHEALE

Celle-ci est très peu fréquente et bien que devant exister n'a pratiquement jamais été décrite.

Seul MONTFORT signale dans une de ses observations une atteinte de la trachée.

A) Signes fonctionnels

Ce sont : toux
expectoration.

B) Signes physiques

Ils n'ont jamais été décrits, et les rares compte-rendus de bronchoscopies que nous avons pu retrouver sont tous unanimes pour assurer l'intégrité de la muqueuse trachéale, faisant même douter de la localisation de l'affection à ce niveau.

C) Evolution

Nous n'en n'avons aucune connaissance.

*

*

*

INSTITUTIONALIZATION

1960-1961

... of the ...
... of the ...
... of the ...

1. Introduction

...

...

2. Objectives

... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...

3. Methodology

...

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

un plus petit à gauche. Une radiographie révèle deux rétrécissements encore plus bas situés au niveau du cardia et du diaphragme. Dilatations progressives par bougies. Biopsie : pas de spécificité.

BENEDICT & LEVER Obs. N° 2

" ... Homme 67 ans.. L'oesophagoscopie met en évidence : un oesophage normal jusqu'à 5 ou 6 cms, au-dessous de la bouche oesophagienne, où siège une membrane étendue en travers de la lumière de l'oesophage, horizontalement avec une ouverture centrale circulaire de 2 à 3 cms de diamètre. Le passage de l'oesophagoscope dilate cet orifice. Radiographie 1 mois après : oesophage normal. Un an après, mêmes lésions. Dilatations par bougies progressives ... "

IMPERATORI

" ... Homme 68 ans. Hématémèse il y a 3 mois. Radiographie : rétrécissement au niveau de la 6ème vertèbre cervicale. Oesophagoscopie : rétrécissement au niveau de la bouche franchi avec quelques difficultés par une bougie 14. Un peu plus tard on laisse à demeure pendant 10 minutes une bougie 24. Le malade peut reprendre le lendemain une alimentation normale et cela continue ... "

ADAM

" ... Femme 55 ans. Rétrécissements au niveau de l'hypopharynx droit et à 23 cms des arcades dentaires. Le passage d'une bougie fut impossible au delà du rétrécissement. Les jours suivants la malade présenta une forte fièvre et mourut 3 jours plus tard. L'autopsie révéla deux perforations de l'oesophage supérieur. La

S. 07. 1968. S. 07. 1968.

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r^2} \right) = -\frac{2}{r^3} \frac{dr}{dt}$

100

partie supérieure de l'oesophage et l'orifice laryngé montraient d'importantes lésions cicatricielles ... "

BAUMANN

" ... Femme 61 ans. Admise dans un état extrême de dénutrition et de déshydratation. Le diagnostic posé est celui de cancer de l'oesophage. Mais découverte d'un pemphigus oculaire. Une oesophagoscopie montre à environ 2 cms après la bouche oesophagienne, un rétrécissement de 3 cms de longueur. La muqueuse n'est pas altérée et les parois ne semblent pas infiltrées. La sténose fut dilatée et un tube laissé à demeure pendant 5 jours. Une radiographie de contrôle ne retrouve plus trace de la sténose et la malade peut se réalimenter ... "

THORST

" ... Homme 82 ans.. Oesophagoscopie : larges fausses membranes blanchâtres. Mort de pneumonie. L'autopsie révèle des rétrécissements diffus et des plus sur la muqueuse oesophagienne ... "

Les manifestations oesophagiennes sont peut-être les plus intéressantes à étudier car les quelques observations que nous avons pu recueillir sont assez détaillées. Par ailleurs elles posent un problème thérapeutique particulier, celui de la sténose.

De par l'étude de tous les cas publiés nous avons résumé les divers signes de la localisation.

un. Ammoner le...
...
...

1015

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

1016

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

A) Signes fonctionnels

C'est essentiellement :

- . une dysphagie, tout d'abord mise sur le compte des érosions buccales et laryngées, progressive, avec des alternatives d'améliorations et d'aggravations

- . une sensation de corps étranger

- . spasmes de l'oesophage (1 cas)

- . hémotémèse (1 cas)

B) Signes physiques

Seule notre observation relate la découverte de bulles typiques au cours de l'oesophagoscopie.

De nombreux auteurs notent des fausses membranes blanchâtres; il s'agit sûrement des pellicules muqueuses post-bulleuses que l'oesophagoscope pousse devant lui.

C) Evolution

Dans cet organe tubulaire qu'est l'oesophage les brides cicatricielles entraînent inévitablement la formation de rétrécissements, de sténoses. Ces rétrécissements ont souvent été décrits. Il s'agit le plus souvent :

- . de palmures membraneuses

- tantôt horizontales

- tantôt circulaires avec un pertuis central

- tantôt verticales divisant l'oesophage en

- oesophages secondaires.

- . ces palmures siègent avant tout à la partie haute

- de l'oesophage, juste en dessous de la bouche oesophagienne; mais certains ont aussi été vus aux niveaux

PHYSICS DEPARTMENT

TO THE HONORABLE CHAIRMAN OF THE BOARD OF TRUSTEES

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

AND TO THE FACULTY

OF THE PHYSICS DEPARTMENT

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS

REPORT

ON THE PROGRESS OF THE PHYSICS DEPARTMENT

FOR THE YEAR 1900-1901

PRESENTED AT THE ANNUAL MEETING OF THE BOARD OF TRUSTEES

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

HELD AT CHICAGO, ILLINOIS, DECEMBER 10-11, 1901

CONTENTS

REPORT OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF TRUSTEES
REPORT OF THE FACULTY
REPORT OF THE PHYSICS DEPARTMENT
REPORT OF THE CHEMISTRY DEPARTMENT
REPORT OF THE BIOLOGY DEPARTMENT
REPORT OF THE MEDICAL DEPARTMENT

CHICAGO, ILLINOIS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

CHICAGO, ILLINOIS

DECEMBER 10-11, 1901

REPORT OF THE PHYSICS DEPARTMENT

FOR THE YEAR 1900-1901

PRESENTED AT THE ANNUAL MEETING OF THE BOARD OF TRUSTEES

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

des rétrécissements anatomiques de l'aorte et du diaphragme.

- . ces brides sont longtemps superficielles, se laissant dilater par bougirages, n'atteignant que la muqueuse, mais peut atteindre à la longue les autres tuniques.

*

*

*

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1911

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1

2

1. The first part of the report

2. The second part of the report

3. The third part of the report
4. The fourth part of the report
5. The fifth part of the report
6. The sixth part of the report
7. The seventh part of the report

8. The eighth part of the report
9. The ninth part of the report
10. The tenth part of the report
11. The eleventh part of the report
12. The twelfth part of the report

13. The thirteenth part of the report
14. The fourteenth part of the report
15. The fifteenth part of the report
16. The sixteenth part of the report
17. The seventeenth part of the report
18. The eighteenth part of the report
19. The nineteenth part of the report
20. The twentieth part of the report

21. The twenty-first part of the report
22. The twenty-second part of the report
23. The twenty-third part of the report
24. The twenty-fourth part of the report
25. The twenty-fifth part of the report

[illegible]

A) La maladie de DUHRING-BROCQ : mais ici l'affection atteint généralement des sujets jeunes; les signes généraux sont nettement marqués; à l'inverse de la DERMATITE BULLEUSE MUCO-SYNECHIANTE où les éléments muqueux sont en grand nombre; ils sont ici très rares sans évolution cicatricielle et c'est l'inverse en ce qui concerne les éléments cutanés, prurigineux.

E) Le Pemphigus vrai : Ce dernier touche fréquemment les muqueuses, mais surtout la bouche, exceptionnellement les yeux.

L'éruption cutanée est monomorphe : bulles sur peau saine, disséminées, sans évolution cicatricielle.

L'état général est profondément altéré, le pronostic vital rapidement en jeu, sauf traitement suspensif aux corticoïdes.

En cas de doute diagnostique :

par le cytodiagnostics de Tzanck montre de grandes cellules nappigieuses monstrueuses, tandis que, dans le P. oculaire ce symptôme spécifique du pemphigus manque toujours : l'étalement sur lame du produit de grattage du plancher de la bulle montre seulement "des cellules banales d'origine sanguine avec des éosinophiles (LORTAT-JACOB).

Signaler l'érythème polymorphe grave type Stevens-Johnson dont la tendance synéchiale des lésions oculaires, l'évolution vers la cécité sont comparables à ceux du pemphigus oculaire, mais s'en différencient par leur survenue au cours d'une évolution fébrile de quelques jours.

Du point de vue O.R.L. le diagnostic peut se poser avec :

- . HERPES : il y a ici des petits bouquets de vésicules superficielles associées au niveau des lèvres, des yeux, de l'orifice anal; des signes généraux.
- . ZONA PHARYNGO-BUCCAL : ici les vésicules peu nombreuses sont strictement unilatérales, siègent dans un territoire bien défini et s'accompagnent de douleurs pharyngées très intenses.
- . VARICELLE : elle est très rare et le diagnostic est posé sur une notion de contagion et l'éruption cutanée.

1. The following are the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Council:

Chairman: Mr. J. H. ...

Secretary: Mr. ...

Members: Mr. ...

Mr. ...

Mr. ...

Mr. ...

Mr. ...

Mr. ...

Mr. ...

Mr. ...

Mr. ...

Mr. ...

Mr. ...

Mr. ...

Mr. ...

Mr. ...

Mr. ...

Mr. ...

Mr. ...

Mr. ...

Mr. ...

Mr. ...

Mr. ...

Mr. ...

Mr. ...

Mr. ...

- . MYCOSE : ce sont ici plus des petits "clous" blanchâtres que de véritables vésicules.

Devant les brides cicatricielles on recherche une notion :

- . de brûlures
- . de traumatisme local par appareil dentaire.

Inversement peut se poser :

- . le diagnostic d'une dysphagie ?
- . le diagnostic d'une sténose ?

Radiographies et surtout oesophagoscopies visualisant les lésions, feront alors rechercher des localisations oculaires, nasales et buccales, ainsi que la notion de poussées d'éléments bulleux ou érosifs douloureux.

*

*

*

... ..

... ..

...

... ..

...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

...

... ..

... ..

... ..

...

... ..

... ..

ESSAIS THERAPEUTIQUES

Figure 1.

L'on conçoit que ne connaissant pas l'étiologie de la maladie, il soit difficile d'instaurer une thérapeutique efficace, certaine, et jusqu'à présent tout se borne à une thérapeutique locale et générale symptomatique. Seule la localisation oesophagienne entraîne une thérapeutique chirurgicale.

A) THERAPEUTIQUE MEDICALE

Elle est totalement inefficace sur l'évolutivité de la maladie, se bornant à quelques succès locaux d'ailleurs très éphémères.

. Pensant à une maladie infectieuse, ont été utilisés :

- Antibiotiques :

- Auréomycine : 1,5 à 2 grs/jour. Certains malades ont reçu jusqu'à 176 grs.

- Rimifon : jusqu'à 120 comprimés.

.. Sulfanides :

- Dagenan : 1,5 gr /jour jusqu'à 175 grs.

• Pensant à une maladie parasitaire :

. Quinacrine : 0,30 gr/jour jusqu'à 40 grs

• Nivaquine : 1 gr/jour

(Chloroquine)

- Pensant à une collagénose :

- Hydrocortisone : jusqu'à 3 grs par jour.

• Pensant à une avitaminose :

• Vitaminothérapie C intra veineuse.

RECEIVED
JAN 15 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Office of the Secretary of Agriculture

Washington, D.C. 20250

Dear Sir: The following information was received from the Bureau of Plant Industry, U.S. Department of Agriculture, on January 14, 1964:

On January 14, 1964, the Bureau of Plant Industry, U.S. Department of Agriculture, advised that the following information was received from the Bureau of Plant Industry, U.S. Department of Agriculture, on January 14, 1964:

The following information was received from the Bureau of Plant Industry, U.S. Department of Agriculture, on January 14, 1964:

The following information was received from the Bureau of Plant Industry, U.S. Department of Agriculture, on January 14, 1964:

The following information was received from the Bureau of Plant Industry, U.S. Department of Agriculture, on January 14, 1964:

The following information was received from the Bureau of Plant Industry, U.S. Department of Agriculture, on January 14, 1964:

. Pensant à une mycose :

. Mycostatine.

. Ont encore été essayés :

. Paraminan I.V. jusqu'à 40 injections.

. Iutazol : 4 comp./jour jusqu'à 250 comprimés.

. Auto-hémothérapie.

. Tous les soins buccaux habituels.

En fait tous ces médicaments ont tous été inefficaces; seuls quelques résultats transitoires ont été enregistrés avec :

. la quinacrine

. la chloroquine

. l'auréomycine; encore que ces résultats ont peut-être coïncidés avec une période régressive de la maladie.

B) THERAPEUTIQUE CHIRURGICALE

Elle intéresse seulement la localisation à l'oesophage et se résume en fait à la destruction des rétrécissements. Ceci se faisant par dilatations progressives à l'aide de bougies de calibre de plus en plus gros. Cette thérapeutique suffisant le plus souvent car :

- le rétrécissement est surtout muqueux.

Cette thérapeutique sera effectuée avec toutes les précautions courantes et sous couvert d'antibiothérapie.

*

*

*

Auteurs	Sexe	Age	Début	Localisation O.R.L.				Autres localisations		
				Bouche	Oesophage	Nez	Larynx	Oeil	Peau	Organes génitaux
LEVER 1	F	60	Oeil	+	D +			+	+	
2	H	67	Peau	+	D +			+	+	
3	F	68	Oeil	+				+		
4	F	62	Bouche	+				+		
5	H	70	Peau	+				+	+	
6	F	43	Peau	+	D +			+	+	
7	F	71	Oeil Bouche	+	D +	+		+		+
8	F	66	Oeil	+				+		
9	F	55	Bouche	+				+		
10	F	47	Oeil					+		
11	F	68	Bouche	+				+		
12	F	70	Oeil	+				+		
13	H	73	Oeil	+				+		
14	F	58	Oeil	+		+		+		
15	F	46	Oeil	+		+		+		
16	H	53	Peau					+	+	
17	H	52	Peau	+				+	+	
18	H	64	Peau	+	D	+		+	+	+
19	H	59	Bouche	+		+		+	+	
CHURCH 1	F	66	Oeil Bouche	+				+		+
2	F	62	Oeil	+				+		+
3	H	62	Oeil	+		+	+	+		
4	F	67	Bouche	+				+	+	+
5	F	75	Bouche	+				+	+	+
6	F	59	Bouche	+			+	+	+	+
7	F	79	Bouche	+				+		

Auteurs	Sexe	Age	Début	Localisation O.R.L.				Autres localisations		
				Bouche	Oesophage	Nez	Larynx	Oeil	Peau	Organes génitaux
HARDY 1	F	68	Bouche	+	D	+		+		+
2	F	72						+	+	
3	F		Bouche	+	D			+	+	+
4	H	55	Nez	+		+	+	+	+	+
5	F	60	Bouche	+	D	+	+	+	+	+
6	F	56	Bouche	+				+	+	+
7	H	55	Bouche	+	D	+	+	+		
8	F	55		+	D	+	+		+	+
9	H	16	Bouche	+			+	+	+	+
10	F	56	Bouche	+		+		+		+
11	F	45	Bouche	+		+	+	+	+	
DUPERRAT 1	F	17 $\frac{1}{2}$	Bouche	+	+	D	+			+
2	F	76	Bouche	+						
3	H	38	Bouche	+	D					
PAUREFI- QUE 1	H	71	Oeil	+			+			
ADAM 1	F	55	Bouche	+	D	+	+			
IMPERA- TORI 1	H	68	Bouche Oeil	+	D	+		+	+	
BAUMANN 1	F	61	Oeil		D	+	+			
GODDE 1	H	72	Oeil	+	D	+	+			
THORST 1	H	82	Nez		D	+				
BLONDEL BONHOMME 1	H	52	Oeil	+		+		+		

Auteurs	Sexe	Age	Début	Localisation O.R.L.				Autres localisations		
				Bouche	Oesophage	Nez	Larynx	Oeil	Peau	Organes génitaux
LANNOIS CURTYL 1	H	69	Bouche	+	D	+	+	+		
GREITHER 1	F	29	Bouche	+	+ D					+
MONTFORT 1	H	57	Peau	+		<u>+</u>	+	+	+	+
2	H		Bouche	+			<u>+</u>		+	
3	H	65	Bouche	+						
4	F	47	Bouche	+	D	+	+		+	+
5	F		Peau Bouche	+	D		<u>+</u>		+	
6	H	60	Bouche	+	D	+		+	+	
7	H	73	Oeil	+			+	+		
8	H	59	Nez		D	+	+	+		
9	H	51	Peau		D		+		+	
10	H	26	Bouche	+			+			
11	H	17	Bouche	+			+			
12	H	72	Bouche	+	D		+			
13	H	48	Peau	+		+	+	+	+	
14	F	41	Oeil	+	D	+	+	+		

+ Lésions franches

+ Lésions moins évidentes

D Dysphagie

CONCLUSION

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

Cette maladie rare et inhabituelle, qui entraîne des lésions muqueuses, intéresse donc de près l'oto-rhino-laryngologiste de par ses localisations buccales, nasales, pharyngo-laryngées et oesophagiennes.

L'étiologie inconnue limite les possibilités thérapeutiques qui se résument à une thérapeutique symptomatique locale.

La maladie caractérisée essentiellement par la "bulle" laissant une érosion, point de départ de rétractions et de cicatrices, est au début pour l'oto-rhino-laryngologiste, une affection douloureuse aiguë entraînant des brûlures buccales gênant la mastication. Peu connue le diagnostic est rarement posé à ce début. L'évolution qui se fait inexorablement vers l'atrophie et la sténose intéresse encore le laryngologiste que le malade consulte pour une dysphagie, et l'oesophagoscopie devant le rétrécissement fera rechercher les autres localisations et l'on mettra en oeuvre une thérapeutique par dilatations progressives qui permettra l'alimentation pratiquement à ce malade âgé.

VU, le Président de Thèse,

VU, le Doyen,

Monsieur le Professeur AUBRY

Monsieur le Professeur BINET

VU, le Recteur,

J. ROCHE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

RECEIVED

NOV 15 1954

11:53 AM

11:53 AM

11:53 AM

11:53 AM

11:53 AM

11:53 AM

11:53 AM

11:53 AM

11:53 AM

11:53 AM

11:53 AM

11:53 AM

11:53 AM

11:53 AM

11:53 AM

11:53 AM

11:53 AM

11:53 AM

11:53 AM

11:53 AM

JACKSON C. et JACKSON Cl. - Broncho-oesophagology Saunders
Cie 1950.

LANNOIS & CURTYL - Annales d'O.R.L. 1910.

LEVER W.F. - Arch. Dermato. and Syph. T. 46, 1942.

LEVER W.F. - Arch. Dermato. and Syph. T. 49, 1944.

LORTAT-JACOB - Bulletin Société Fcse Dermato. T. 63, 1956.

MONTFORT - Thèse Bordeaux, 1902.

PAUREFIQUE, MAYOUX, ROCHE - Bulletin Société Fcse Dermato.
T. 63, 1956.

TERRACOL - Les maladies de l'oesophage Masson, 1951.

THORST A. - Archivs fur laryng. in rhin. T. 25, 1911.

THORST A. - Archivs fur laryng. Rh. T. 31, 1919.

THORST A. - Deutsche Medizine de Wochen T. 45, 1919.

1. The first part of the report is devoted to a general survey of the situation in the country.

2. The second part contains a detailed analysis of the economic situation.

3. The third part deals with the social and cultural aspects of the situation.

4. The fourth part discusses the political situation and the role of the government.

5. The fifth part contains conclusions and recommendations for the future.

6. The sixth part is a summary of the main findings of the report.

7. The seventh part contains a list of references and sources.

8. The eighth part is a list of appendices.

9. The ninth part contains a list of abbreviations and symbols.

10. The tenth part is a list of footnotes.

11. The eleventh part contains a list of tables and figures.

12. The twelfth part is a list of references and sources.

TABLE DES MATIERES

---:---

| | <u>Pages</u> |
|---|--------------|
| GENERALITES : | 1 |
| HISTORIQUE | 4 |
| ETIOLOGIE | 5 |
| HISTOLOGIE | 7 |
| OBSERVATION PERSONNELLE INEDITE | 10 |
| LE TABLEAU CLINIQUE DE LA D.B.M.S. : | 19 |
| ELEMENT ESSENTIEL : la bulle | 22 |
| SES LOCALISATIONS : une essentielle, l'oeil ... | 23 |
| : la localisation cutanée ... | 24 |
| LES LOCALISATIONS DU DOMAINE O.R.L. : | 25 |
| LA LOCALISATION BUCCALE | 26 |
| LA LOCALISATION PHARYNGEE | 29 |
| LA LOCALISATION NASALE | 33 |
| LA LOCALISATION LARYNGEE | 37 |
| LA LOCALISATION TRACHEALE | 40 |
| LA LOCALISATION OESOPHAGIENNE | 41 |
| LES LOCALISATIONS CUTANEEES | 46 |
| L'EVOLUTION EN GENERAL | 47 |
| LE DIAGNOSTIC | 48 |
| THERAPEUTIQUE | 51 |
| CONCLUSION | 53 |
| BIBLIOGRAPHIE | 54 |

---:---:---:---:---:---:---:---:---:---:---:---:---

Pages

| | |
|----|---|
| 1 | GÉNÉRALITÉS : |
| 4 | HISTORIQUE |
| 5 | ÉTIOLOGIE |
| 7 | HISTOLOGIE |
| 10 | OBSERVATION PERSONNELLE |
| 13 | LE TABLEAU CLINIQUE DE LA D.S.M.S. : |
| 22 | ÉLÉMENT ÉSSSENTIEL : la polle |
| 23 | SES LOCALISATIONS : ses localisations : |
| 24 | : la localisation |
| 25 | LES LOCALISATIONS DU DOMAINE O.R.L. : |
| 26 | LA LOCALISATION BUCCALE |
| 29 | LA LOCALISATION PHARYNGÉE |
| 33 | LA LOCALISATION NASALE |
| 37 | LA LOCALISATION LARYNGÉE |
| 40 | LA LOCALISATION TRACHEALE |
| 41 | LA LOCALISATION OESOPHAGIENNE |
| 46 | LES LOCALISATIONS CUTANÉES |
| 47 | L'ÉVOLUTION EN GÉNÉRAL |
| 48 | LE DIAGNOSTIC |
| 51 | THÉRAPEUTIQUE |
| 53 | CONCLUSION |
| 54 | BIBLIOGRAPHIE |

